

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-1-4-9310539



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 5
du 25 Mars 1993

VIGNE

Flavescence Dorée

Il est recommandé d'effectuer des traitements à base d'Oléoparathion (45 g/hl) contre les oeufs de cicadelles blanches vectrices de cette maladie. Très sensibles près du débourrement.

Excoriose

Attention. Ne traiter plus contre cette maladie avec les produits arsenicaux à moins de 10 jours du débourrement. Dans la plupart des cas, c'est trop tard; risque de phytotoxicité.

Desherbage

Il est encore temps d'utiliser les herbicides de position.

- Solicam (Diuron + Flurazon)
- Zorial (Diuron)
- Axian (Terbuthylazine + Termeton)
- Ouragan (Sulfosate)

Erinose

Ce petit acarien qui provoque des petites galles rougeâtres à la face supérieure des feuilles dans certaines parcelles peut être combattu par des applications de soufre micronisé à 2 kg, 2,5 l de spécialité par hl d'eau au stade "bourgeon dans le coton".

Bourgeon dans
le coton



--> Attention ce stade est dépassé dans certaines situations.

--> Au stade pointe verte = utiliser l'oléoparathion

Pointe verte

1

P. 81



ARBRES FRUITIERS

Pêchers, nectariniers

Les stades phénologiques varient de D à F voire G.


"Chute des pétales", à ce stade il convient d'être vigilant aux attaques de "monilia" et de "Thrips" (petit insecte filiforme aux ailes frangées dont les larves blanches piquent les tissus fragiles du jeune fruit noué qui sera marqué par des taches liégeuses en grossissant et déprécié à la récolte).

Contre cet insecte, intervenir dans les parcelles avec :



Chute des Pétales

M. Actives	P.Commercial
Acephate Fluvalinate Méthamidophos	ORTHENE KLARTAN TAMARON
TAMARON (pas de mélange avec T.M.T.D ex : Pomarsol)	



Thrips adulte

Pruniers d'Ente

Les stades sont très variables, mais avec une dominante C.D.

Amandiers

Renouveler le traitement contre le "Fusicocum et Monilia"

AGRUMES

La taille est bien entamée, penser aux traitements avec les huiles de Pétrole. Type :

- | | |
|--------------|-------------------------|
| - Euphytane | huiles de pétrole à 1 % |
| - Oliocin | " " |
| - Ovipron | " " |
| - Seppic été | " " |

AGRUMES (Suite)

Dans certains vergers encore rares, on observe des pullulations d'oeufs et des larves d'acariens "araignées rouges". On peut donc ajouter dans cette situation, un acaricide type Néoron (bromopropylate)

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN

Les chenilles sont en train de descendre en terre le long du tronc. Actuellement, il n'y a pas de traitement à effectuer.

On doit se contenter d'entourer le tronc d'un anneau de glu sur lequel vont s'agglutiner les chenilles.

Ramasser tous les jours les chenilles dans un sac poubelle et les brûler.

(C) S.P.V. - 1993 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.